基于多位点分子标记和线粒体基因组学中国蚌类(蚌目:蚌超科)物种分类与系统进化研究*

武瑞文^{1,2}, 安建梅¹, 陈如如¹, 欧阳珊², 吴小平^{2**}

(1: 山西师范大学生命科学学院, 临汾 041000)

(2: 南昌大学生命科学学院, 南昌 330031)

摘要: 中国是东亚蚌类(蚌目:蚌超科)物种分布中心,共记录有 26 属。然而,在世界蚌目框架下,中国仍缺乏一个完整科学的蚌类分类系统。本研究基于多位点分子标记(COI、16S、28S)和线粒体基因组学重构聚焦于蚌超科的蚌目系统发育关系,ML、BI 和 BEAST 系统发育结果均支持蚌科 5 亚科分类系统,即(((Ambleminae + Gonideinae) + Rectidentinae) + Unioninae) + Parreysiinae;珍珠蚌科 2 亚科分类系统,即(Gibbosulinae + Margaritiferinae);中国蚌类隶属蚌科 4 亚科(Gonideinae, Rectidentinae, Unioninae, Parreysiinae) 13 族和珍珠蚌科两亚科(Gibbosulinae, Margaritiferinae)。基于化石标定的分子钟显示:蚌科物种分化时间为中三叠世(median = 232.07 Ma),其中雕刻蚌亚科(Parreysiinae)起源和物种分化时间早于其他亚科;矩形蚌亚科(Rectidentinae)物种分化时间最晚,为晚白垩世(median = 94.72 Ma);小方蚌亚科(Ambleminae)和隆脊蚌亚科(Gonideinae)最近共同祖先分化于晚侏罗纪(median = 144.69 Ma),珍珠蚌科起源于晚石炭世(median = 312.61 Ma),物种分化于晚白垩世(median = 91.59 Ma),中国蚌科现生物种最早起源时间可追溯到白垩纪(中国尖嵴蚌(*Acuticosta chinensis*), median = 114.36 Ma)。蚌超科线粒体基因重排分析显示:蚌超科线粒体基因组有 4 种基因排列方式(GO),珍珠蚌科独享一种(GO1);蚌科中 Unioninae 和 Ambleminae 共享一种(GO2);Gonideinae 有 2 种基因排列方式(GO3 和 GO4),其中室蚌(*Chamberlainia hainesiana*)独享一种(GO4),其余物种共享一种(GO3)。以往作为高阶元分类的贝壳形态、钩介幼虫形态以及育儿囊类型,并不能作为蚌科属及以上阶元分类依据。本研究重构了世界蚌目聚焦于蚌超科的系统发育关系和进化历史,建立了中国蚌类分类系统,为今后该类群区系多样性研究及资源保护提供了分类依据。

关键词: 蚌科;珍珠蚌科;系统发育;线粒体基因组学;基因排列;形态学;解剖学

Taxonomy, phylogeny and evolution of freshwater mussels (Unionoida: Unionoidea) in China revealed by multilocus phylogenetic analyses and mitochondrial phylogenomics*

Wu Ruiwen^{1,2}, An Jianmei¹, Chen Ruru¹, Ouyang Shan² & Wu Xiaoping^{2**}

(1: School of Life Science, Shanxi Normal University, Linfen 041000, P.R.China)

(2: School of Life Sciences, Nanchang University, Nanchang 330031, P.R.China)

Abstract: China is the most species-rich region for the Unionoidea (Unionidae + Margaritiferidae) in East Asia, with a total of 26 genera. However, in the context of global unionids, an integrated and scientific phylogenetic taxonomy for Chinese Unionoidea is still lack. Based on the multilocus molecular markers (COI, 16S, 28S) and mitochondrial genomics, we reconstructed the phylogenetic relationship of the Unionoida by focusing on the Unionoidea. All phylogenetic results of ML, BI and BEAST supported five monophyletic clades for subfamily levels within Unionidae, i.e. (((Ambleminae + Gonideinae) + Rectidentinae) + Unioninae) + Parreysiinae, and two subfamilies within Margaritiferidae, i.e. (Gibbosulinae + Margaritiferinae). Chinese Unionoidea belonged to four subfamilies (Gonideinae, Rectidentinae, Unioninae, Parreysiinae) thirteen tribes of Unionidae and 2 subfamilies (Gibbosulinae, Margaritiferinae) of Margaritiferidae. The fossil-calibrated molecular clock suggested the Unionidae species divergence at the Middle Triassic (median = 232.07 Ma). The origin and species divergence time of the Parreysiinae were earlier than other subfami-

* 2020-12-25 收稿; 2021-04-15 收修改稿。

国家自然科学基金项目(31772412)资助。

** 通信作者; E-mail: xpwu@ncu.edu.cn.

lies. The species divergence time of Rectidentinae was the latest among all subfamilies, at the Late Cretaceous (median = 94.72 Ma). The most recently common ancestor of Ambleminae and Gonideinae diverged at the Late Jurassic (median = 144.69 Ma). Margaritiferidae originated at the Late Carboniferous (median = 312.61 Ma), and species divergence at the Late Cretaceous (median = 91.59 Ma). The oldest living unionid species in China could be traced back to the Cretaceous (i.e. *Acuticosta chinensis*, median = 114.36 Ma). Mitochondrial gene order (GO) analysis of the Unionoidea revealed that the presently published Unionoidea mitochondrial genome had four gene arrangements; one was exclusive to the Margaritiferidae (GO1); Unioninae and Ambleminae of Unionidae shared another one (GO2); Gonideinae had two gene arrangements (GO3 and GO4), of which was exclusive to *Chamberlainia hainesiana* (GO4). The morphological features of shells, glochidia and marsupium, which were used to high-level classification, could not be regarded as diagnostic features for the subfamily and the tribe level. This study reconstructed the phylogenetic relationship and evolutionary history of Unionoidea worldwide and established complete systematics of Unionoidea in China, which providing the taxonomic basis for the diversity research and resource conservation of Chinese unionids.

Keywords: Unionidae; Margaritiferidae; phylogeny; mitochondrial genomics; gene order; morphology; anatomy

蚌隶属软体动物门(Mollusca),双壳纲(Bivalvia),蚌目(Unionoidea),包括3超科6科:Unionoidea (Unionidae + Margaritiferidae), Etherioidea (Mycetopodidae + Iridinidae + Etheriidae), Hyrioidea (Hyriidae)^[1-2]. 作为淡水生物群落重要组成部分,蚌具有重要生态功能和经济价值^[3-4]. 然而,受人类活动影响,该类群已成为最受威胁的动物群之一^[5-6].

中国长江流域是东亚蚌类(蚌目:蚌超科)物种分布中心^[1,7]. Heude^[8]曾依据贝壳形态特征描述中国蚌类140余种,奠定了我国蚌类分类基础. 此后, Simpson^[9]以多种形态特征并将育儿囊类型作为属上阶元分类依据,记录中国蚌类14属,隶属蚌科(Unionidae) Unioninae和Hyriinae两个亚科. Haas^[10]在Simpson研究基础上增加贝壳形态和钩介幼虫形态数据对其分类修订,记录中国蚌类20属,隶属蚌科 Unioninae、Quadrulinae、Anodontinae和Lampsilinae四个亚科. 1950s开始,我国贝类学家做了大量区系调查和物种检索整理^[4, 11-14],基于贝壳形态和解剖特征将我国蚌类分为蚌科珠蚌亚科(Unioninae)和无齿蚌亚科(Anodontinae),以及珍珠蚌科(Margaritiferidae)珍珠蚌属(*Margaritana*)^[4]. 到1990s,我国贝类学家重视软体部分解剖学和形态学特征,依据钩介幼虫形态和育儿囊类型,分类工作取得了一些进展和突破^[15-18],但对中国蚌科属上阶元分类研究甚少,仍延续珠蚌亚科和无齿蚌亚科分类系统,而珍珠蚌科由于中国分布仅数种,其属上阶元分类鲜有探讨.

最近十几年,随着分子生物学技术的发展,基于贝壳形态学和解剖学分析与分子系统发育相结合的蚌目系统学研究得到快速发展,特别是蚌科系统发育框架已基本构建^[19-24],但亚科阶元的系统发育关系仍有争议(图1). 近几年的分子系统学研究通过增加分类单元促进了对蚌科高阶元系统发育的理解,但也存在亚科阶元重要节点处都出现低支持率现象,且得到的蚌科系统发育框架某些亚科并未形成单系群^[21-24]. 世界上珍珠蚌科记录有效物种17种,广泛分布于世界各地,但其分布呈现明显不连续性和斑块性^[2,25]. 由于区域研究不平衡,该科分子系统研究最近几年才出现. Bolotov等^[26]和Araujo等^[27]基于多位点分子标记尝试解析该科系统发育关系,但并没有阐明高阶元系统分类. Lopes-Lima等^[25]基于多分子标记和线粒体基因组学对该科提出2亚科4属分类系统.

中国蚌类分子系统学研究多聚焦于单属系统发育分析^[28-29]或单种线粒体基因组学研究^[30-32]. 少数对中国蚌类高阶元系统分类的研究^[33-36],由于分类单元选择局限、系统发育分析方法单一、支序节点支持率低等原因导致很多属分类位置众说纷纭(表1). 中国作为继北美另一蚌类物种分布中心^[1-2,7],补充其分类单元于当前蚌目系统发育框架,不仅能澄清中国蚌类物种分类地位,同时也能进一步发展完善世界蚌目系统发育关系.

为此,本研究基于多位点分子标记(线粒体COI、16S rRNA、核基因28S rRNA)和线粒体基因组学,在蚌目系统发育框架下重构聚焦于世界蚌超科的系统发育关系,明晰中国蚌类物种分类地位和进化历史;同时检查和搜集蚌科14属物种贝壳形态学和解剖学特征,探讨蚌科属上阶元分类特征.

图 1 蚌科亚科阶元系统发育关系

Fig.1 Summary of recent phylogenetic hypotheses of subfamilies in the Unionidae

1 材料和方法

1.1 分类单元选择和数据集构建

整理 GenBank 中所有蚌类序列,中国蚌超科当前(截止于 2020 年 12 月)可利用分子数据共计 24 属. 从 GenBank 中选择所有可利用的中国蚌超科分子序列,同时下载代表蚌超科各亚科分类单元的多位点分子数据和蚌超科所有 F 型线粒体基因组数据,构建聚焦于蚌超科的两个蚌目分子数据集:1) 基于线粒体 COI 和 16S 以及核基因 28S 的多位点分子数据集;2) 基于 12 蛋白质编码基因(除 *atp8*)的线粒体基因组数据集. 最终,构建的多位点分子标记数据共计 89 种,其中中国蚌超科 24 属 28 种;构建的线粒体基因组数据集共计 73 种,其中中国蚌超科 18 属 29 种. 另选择三角蛤目(Trigoniida)海洋双壳类 *Neotrigonia margaritacea* 和 *Neotrigonia lamarchii* 为外类群(附表 I ~ II).

1.2 序列比对和分区模型筛选

对于多位点分子数据集,使用 MEGA5.0^[37] 在无脊椎密码子翻译模式下将 COI 翻译成蛋白质序列,选择内置程序 MUSCLE 默认设置进行序列比对;使用 MAFFT v7^[38] 选择 Q-INS-i 算法比对核糖体基因 16S 和 28S. 利用 Gblocks v0.91b^[39] 对模糊比对区域切割,设置参数核糖体基因 Block 最小长度为 2 bp,允许缺失位点设置为 With half;蛋白质编码基因 Block 最小长度为 3 bp. 比对切割后的核苷酸序列利用 SequenceMatrix^[40] 串联拼接,为后续系统发育分析构建多位点数据集(COI+16S+28S).

对于线粒体基因组数据集,利用 PhyloSuite^[41] 从 GenBank 中批量下载所有选定的线粒体基因组数据,提取生成的核苷酸(NUC)数据包、氨基酸(AA)数据包以及基因排列(GO)文件. 使用 MAFFT v7 分别对 NUC 序列和 AA 序列比对,并利用 Gblocks v0.91b 删除比对中模糊对齐区域,移除所有缺失位点. 每个基因的 NUC 序列比对结果和 AA 序列比对结果分别保存,利用 PhyloSuite 串联生成后续系统发育分析的 NUC 数据集和 AA 数据集.

多位点数据集和两个线粒体基因组数据集基于编码基因和密码子分区处理:多位点数据执行 5 分区方

案, NUC 数据集执行 36 分区方案, AA 数据集执行 12 分区方案. 在模型选择软件的统计标准中, BIC (bayesian information criterion) 具有较高的准确性和精确性^[42]. 因此利用 PartitionFinder v1.1.1^[43] 和 ModelFinder^[44] 基于最小 BIC 分别对多位点数据集、NUC 数据集和 AA 数据集进行最适分区策略和模型筛选. 不同数据集分区策略和模型筛选见附表Ⅲ.

表 1 中国蚌科属阶元分类历史
Tab.1 Historical classification systems of Chinese genera in the Unionidae

属名 Genus	曾用属名	黄艳艳等, 2003 ^[33]	周春花等, 2007 ^[29]	欧阳解秀等, 2011 ^[34]	黄晓晨等, 2013 ^[28]	欧阳解秀等, 2015 ^[35]	武瑞文等, 2019 ^[36]
尖丽蚌属 <i>Aculamprotula</i> Wu et al., 1999		—	Unioninae	Unioninae	Unioninae	Unioninae	Unioninae
中国无齿蚌属 <i>Sinanodonta</i> Modell, 1944	<i>Anodonta</i>	Anodontinae	Anodontinae	Anodontinae	—	Anodontinae	Anodontinae
冠蚌属 <i>Cristaria</i> Schumacher, 1817		Anodontinae	Anodontinae	—	Anodontinae	—	Anodontinae
楔蚌属 <i>Cuneopsis</i> Simpson, 1900		Unioninae	Unioninae	Unioninae	—	Unioninae	Unioninae
裂脊蚌属 <i>Schistodesmus</i> Simpson, 1900		Unioninae	Unioninae	Unioninae	—	Unioninae	Unioninae
结节蚌属 <i>Nodularia</i> Conrad, 1853	<i>Unio</i>	Unioninae	Unioninae	Unioninae	—	Unioninae	Unioninae
船蚌属 <i>Anemina</i> Haas, 1969	<i>Anodonta</i>	Anodontinae	—	Anodontinae	—	Anodontinae	Anodontinae
尖嵴蚌属 <i>Acuticosta</i> Simpson, 1900		Unioninae	Unioninae	Unioninae	—	Unioninae	Anodontinae
丽蚌属 <i>Lamprotula</i> Simpson, 1900		Ambleminae	Ambleminae	Ambleminae	—	Ambleminae	Gonideinae
扭蚌属 <i>Arconaia</i> Conrad, 1865 *		Unioninae	Unioninae	—		Unioninae	Anodontinae
矛蚌属 <i>Lanceolaria</i> Conrad, 1853		Unioninae	Unioninae	Unioninae	—	Unioninae	Anodontinae
鳞皮蚌属 <i>Lepidodesma</i> Simpson, 1896		Unioninae	—	—	—	—	—
锄蚌属 <i>Ptychorhynchus</i> Simpson, 1900		Ambleminae	—	—	—	—	Gonideinae
中国蛭蚌属 <i>Sinosolenia</i> Conrad, 1869	<i>Solenia</i>	Ambleminae	—	Ambleminae	Gonideinae	Ambleminae	Gonideinae
中国帆蚌属 <i>Sinohyriopsis</i> Starobogatov, 1970	<i>Hyriopsis</i>	Ambleminae	Ambleminae	Ambleminae	Gonideinae	Ambleminae	Gonideinae

* 扭蚌属现已合并到矛蚌属;曾用属名的分类历史见讨论部分. —表示其研究未包含该属.

1.3 系统发育重建

所有数据集, 基于上述筛选的分区策略和模型构建 BI (Bayesian inference) 和 ML (Maximum likelihood) 系统发育分析. 在 MrBayes v.3.2.6^[45] 中执行 BI 分析. 运行 4 条马尔可夫链, 1 百万代, 每 1000 代抽样一次, burn-in 25%, 分裂频率平均标准差低于 0.01 时停止. 利用 IQ-TREE^[46] 基于分区模型, 运行 1000 次重复抽样检验, 构建 ML 系统发育树. 利用在线 iTOL(<https://itol.embl.de/itol.cgi>) 实现系统发育树和基因排列文件的可视化和编辑.

利用 MLGO (maximum likelihood for gene order analysis)^[47] 基于 PhyloSuite 生成的线粒体基因重排文件

运行 1000 次重复抽样检验构建系统树,推测祖先基因排列. 利用 CREx (common interval rearrangement explorer)^[48] 推测线粒体基因重排事件,包括基因反转(reversals)、换置(transpositions)、反向换置(reverse transpositions)、串联重复随机丢失(tandem duplication random loss, TDRL).

1.4 化石标定和分化时间估算

基于多位点基因数据集利用 BEAST v1.7.5^[49] 进行物种分化时间估算,构建物种进化树. 选择 uncorrelated lognormal clock model 作为分子钟模型,树的先验模型设定为 birth-death speciation process. 利用 PartitionFinder v1.1.1 对数据分区替代模型筛选,结果见附表 IV. MCMC 代数设置为 3 亿代,取样频数为 50000,设置不同分区替换模型为 unlink. 利用 Tracer 1.5 估算收敛和有效取样大小,确保均大于 200. 最后在 TreeAnnotator v1.7.5 软件中设置 burnin 10%,后验概率值限制为 0.5,节点显示 height median,生成最大谱系置信树.

参考先前研究,选择 5 个可靠的化石标定点分化时间:(1) 基于奥陶纪早期 *Noradonta* Pojeta & Gilbert-Tomlinson, 1977^[50],参考 Huang 等^[23],对 Palaeoheterodonta 树的基部利用 normal distribution prior 限制为 471~478 Ma (mean=475 Ma, stdev=2);(2) 最古老的化石 *Shifangella* Liu & Luo, 1981 可追溯至三叠纪晚期,参照 Wu 等^[51],对珍珠蚌科起源时间标定 230 Ma (exponential prior, lambda=30);(3) 蚌科最古老的化石发现在北美莫里逊组,参照 Graf 等^[52],将蚌科最小分化时间设置为 152 Ma (exponential prior, lambda=20);(4) 化石 *M. martinsoni*,地质年代为渐新世和始新世,参照 Huang 等^[23],*M. dahurica*-*M. margaritifera* 最近共同祖先最小设定为 34 Ma (exponential prior, lambda=9.3);(5) 化石 *Lamprotula hungi*,地质年代为渐新世和始新世,参照 Wu 等^[51],*Lamprotula leai* 和 *L. caveata* 最近共同祖先最小设定为 34 Ma (exponential prior, lambda=9.3).

1.5 形态学和解剖学分析

对保存于南昌大学生物博物馆的蚌科 14 属 17 种贝壳形态检查,包括贝壳形状、贝壳厚度、外套线和铰合部结构(附表 V).

综合前期研究和资料查阅,整理蚌科 24 属 28 种解剖学特征,包括钩介幼虫形态、育儿囊特征、繁殖特征、出入水孔特征等(附表 VI).

2 结果

2.1 基于多位点分子数据的蚌目系统发育分析

基于多位点数据集构建的 ML 和 BI 树拓扑结构大体一致(图 2,附图 I),且绝大多数节点为强自展支持率(70%~100%)和后验概率值(0.90~1.00).

系统发育树显示蚌目各科系统发育关系如下:((Margaritiferidae + Unionidae) + (Iridinidae + (Etheriidae + Mycetopodidae))) + Hyriidae(图 2). 蚌科形成五个互为单系群亚科,亚科阶元系统发育关系如下:(((Ambleminae + Gonideinae) + Rectidentinae) + Unioninae) + Parreysiinae(图 2). 中国蚌超科 24 属隶属于珍珠蚌科(Margaritiferidae)和蚌科(Unionidae),其中珍珠蚌科中分属 2 个亚科(Gibbosulinae, Margaritiferinae);蚌科分属 4 亚科(Unioninae, Parreysiinae, Gonideinae, Rectidentinae) 13 族(图 2).

2.2 蚌目线粒体系统发育基因组学

基于线粒体 NUC 数据集和 AA 数据集共构建 4 棵拓扑结构完全一致的系统发育树(ML 树 2, BI 树 2),且绝大多数节点为 100% 自展支持率和 1.00 后验概率值(图 3).

系统发育树显示蚌目各科系统发育关系为:((Margaritiferidae + Unionidae) + (Iridinidae + Mycetopodidae)) + Hyriidae,蚌科互为单系群的 3 个亚科系统发育关系为:((Unioninae + Gonideinae) + Ambleminae).

中国蚌科(Unionidae) 16 属 27 种隶属 2 个亚科,即 Unioninae 和 Gonideinae. *Aculamprotula*、*Cuneopsis*、*Nodularia*、*Schistodesmus*、*Cristaria*、*Acuticosta*、*Lanceolaria*、*Sinanodonta*、*Anemina* 和 *Lepidodesma* 隶属于 Unioninae; *Lamprotula*、*Sinosolenia*、*Sinohyriopsis*、*Chamberlainia*、*Parvasolenia* 和 *Ptychorhynchus* 隶属于 Gonideinae;中国珍珠蚌科(Margaritiferidae) 2 属 2 种隶属 2 个亚科,即 Margaritiferinae 和 Gibbosulinae(图 3).

2.3 蚌超科线粒体基因组基因排列

蚌超科(Unionoidea)线粒体基因组有 4 种基因排列方式(图 4). 珍珠蚌科(Margaritiferidae)独享一种基

图2 基于多位点数据集构建的蚌目系统发育树(BI 和 ML 树拓扑结构大体一致,这里仅展示 BI 树; 图中不同颜色分枝代表蚌目不同科阶元以及蚌科亚科阶元,阴影部分代表蚌科族阶元; 分枝末端圆点表示中国蚌种,三角表示中国蚌属;M 表示珍珠蚌科珍珠蚌亚科,G 表示珍珠蚌科弓背蚌亚科)

Fig.2 Phylogenetic relationship of Unionoida based on three-gene dataset(Since the topologies of BI and ML trees are broadly consistent, only BI tree is shown here. Colored branches represent order levels of different families and subfamily levels of the Unionidae. Shaded sections represent tribe levels of the Unionidae. The circles at the end of the branch represent the Chinese unionid species, and the triangles represent the Chinese unionid genera. M. Margaritiferinae, G. Gibbosulinae)

因排列方式 G01;蚌科(Unionidae) Unioninae 和 Amblesinae 共享一种基因排列方式 G02;Gonideinae 有 2 种基因排列方式 G03 和 G04,其中室蚌(*Chamberlainia hainesiana*)独享 G04 基因排列,其余 Gonideinae 物种共享 G03 基因排列(图 4). 中国蚌超科物种线粒体基因组享有上述全部 4 种基因排列方式.

珍珠蚌科(Margaritiferidae)基因排列 G01 与蚌科(Unionidae) Unioninae 和 Amblesinae 基因排列 G02 由于[*trn N-nad2*]基因块与 *trn E* 易位而发生重排. 基于线粒体基因重排构建的系统树显示:蚌科 G02 位于 G03 与 G04 的基部,推测为蚌科祖先基因排列. G03 与祖先基因排列 G02 基因重排主要发生在 *trn W* 和 *cox2* 间,由祖先基因排列经一次串联重复随机丢失事件进化而来. G04 与祖先基因排列 G02 基因重排发生在 *atp6-nad5* 间,由祖先基因排列经多次基因反转、换置、以及串联重复随机丢失事件进化而来(图 5).

2.4 化石标定的分子钟

利用 BEAST 基于多位点数据集构建的蚌目系统发育树,(Iridinidae + (Etheriidae + Mycetopodidae))位

图 4 基于线粒体 12 蛋白质编码基因构建的系统发育树和相应的物种线粒体基因排列
Fig.4 Phylogenetic trees of freshwater mussels inferred from 12 protein-coding gene sequences and the corresponding mitochondrial gene order (GO)

图 5 基于线粒体基因重排 MLGO 分析的系统树和 CREx 分析推定的基因重排事件

Fig.5 Phylogenetic trees inferred from MLGO analysis and putative gene rearrangement events based on gene order (T: transpositions; R: reverse; TDRL: tandem duplication random loss)

Gonideinae) + Rectidentinae) + Unioninae) + Parreysiinae,各亚科均得到节点支持率强的单系群分支。Huang 等^[23]通过对蚌科分类单元充分取样构建的蚌目系统发育树,由于选择分类单元可利用的分子标记不完整,导致蚌科亚科阶元分支节点支持率低,且 Gonideinae 为复系群。Pfeiffer 等^[24]利用锚定混合富集探针增加更多分子标记构建了蚌科 4 亚科分类系统,但分类单元取样有限,且亚科阶元分支支持率低。本研究在当前具

图6 基于多位点数据集化石标定的系统发育树(节点条状表示95% HPD,星号表示时间标定的化石, 分枝末端圆点表示中国蚌种,三角表示中国蚌属, Ma: 百万年前, Q.: 第四纪, N.: 第三纪)

Fig.6 Fossil-calibrated phylogeny based on three-gene dataset (Node bars denote the 95% highest posterior density (HPD). Fossils used for calibrations are marked by star signs. The circles at the end of the branch represent the Chinese unionid species, and the triangles represent the Chinese unionid genera. Ma: million years ago, Q.: Quaternary, N.: Neogene.)

争议的亚科阶元中选择代表各亚科分类单元,综合取样单元完整的3分子标记重构蚌目系统发育关系,结果支持亚科阶元 Pseudodontinae 降级为族阶元 Pseudodontini,同时支持亚科阶元 Rectidentinae 的有效性。蚌科族阶元的系统分类近几年讨论较多,并且随着蚌科分类单元的增加,系统发育框架不断有新的族阶元被界定^[21-23]。本研究族阶元分类与 Huang 等^[23]结果基本一致,但由于 *Cuneopsis*、*Nodularia*、*Schistodesmus*、*Unio* 形成单系群,故支持 Pfeiffer 等^[24]将其归类于 Unionini。珍珠蚌科全球现存有效物种仅 17 种。当前,该科 2 亚科 4 属分类系统在本研究中进一步得到佐证。中国该科记录 4 种,即珠母珍珠蚌 *Margaritifera dahurica* (Middendorff, 1850)、粗糙弓背蚌 *Gibbosula confragosa* (Frierson, 1928)、佛耳弓背蚌 *Gibbosula mansuyi* (Dautzenberg & Fischer, 1908) 和猪耳弓背蚌 *Gibbosula rochechouartii* (Heude, 1875),隶属珍珠蚌亚科 (Margaritiferinae) 和弓背蚌亚科 (Gibbosulinae)。

在 BEAST 分子钟中,珍珠蚌科起源和分化时间出现 221 Ma 的长分枝现象,这可能是祖先亲缘关系近的分类群在古环境压力下灭绝所致,最古老的化石记录在侏罗纪中期和晚期也支持这一假设^[26]。由于这种灭绝,该科物种分化时间可能会更早。然而,现生珍珠蚌分化却可追溯到白垩纪晚期 91 Ma,这与先前研究取得一致 (mean age = 88.33 Ma)^[53]。本研究蚌科分化时间与 Huang 等^[23]取得基本一致。长江流域独特且多样的生态系统孕育了我国物种多样性丰富、特有程度高、远古物种多的蚌类,我国蚌科物种分化时间集中发生于晚白垩纪和古近纪 (36~100 Ma)。中国特有物种中国尖嵴蚌 (*Acuticosta chinensis*) 可能是蚌超科最古老的现生物种,其物种起源可追溯至白垩纪 (mean age = 114.36 Ma)。

此外,对 GenBank 所有蚌超科线粒体全基因组搜集重构系统发育关系时发现,*Lamprotula scripta* (NC_030258)与 *Lamprotula* 物种聚为一支,*Lamprotula gottschei* (NC_023806)与 *Schistodesmus lampreyanus* 形成姐妹群,本研究对这 2 条序列提出质疑。*Lamprotula scripta* 已有多种分子数据证实该物种隶属 *Aculamprotula*,对其重新采样并线粒体基因组测序 (NC_045529),也证实该物种分类位置为 *Aculamprotula*^[54-55]。另 *Lamprotula gottschei* 与 *Schistodesmus lampreyanus* 形成姐妹群,推测可能是样本鉴定有误或序列测定过程 DNA 污染所致。

3.2 中国蚌超科属阶元分类系统

本研究构建了目前最为全面的中国蚌超科系统发育关系,明确了中国蚌超科 24 属系统分类地位(表 2)。结合历史相关资料,整理得中国蚌超科共计 26 属。由于假柏夫蚌属(*Pseudobaphia*)和菱形蚌属(*Rhombuniopsis*)缺乏分子数据,暂未对其做高阶元分类(表 2 中 * 表示)。

3.3 争议属分类评述

本研究对中国蚌科属级阶元分歧较大的属,如中国蛭蚌属(*Sinosolenia*)、中国帆蚌属(*Sinohyriopsis*)、结节蚌属(*Nodularia*)、中国无齿蚌属(*Sinanodonta*)和船蚌属(*Anemina*)系统评述,阐明争议属分类历史。

Subfamily Gonideinae Ortmann, 1916

Genus *Sinosolenia* Bolotov, Kondakov, Konopleva & Vikhrev, 2021

Type species: *Sinosolenia recognita* (Heude, 1877)

Species: *Sinosolenia oleivora* (Heude, 1877) 图 7A

Comments: 该属为中国特有属。属内物种基于贝壳形态长期归类于泰国分布的以 *Solenia emarginata* (Lea, 1860) 为模式种的蛭蚌属(*Solenia*)。随着蚌科分子序列增加,最近系统发育分析发现中国蛭蚌属与分布于泰国的蛭蚌属隶属不同亚科,中国蛭蚌属隶属 Gonideinae,而泰国蛭蚌属隶属 Rectidentinae^[22,24]。Bolotov 等^[56] 提议中国分布的该类群应另立一属,即 *Sinosolenia*。

Description: 贝壳窄长似蛭形,壳前部细圆,狭长,后部逐渐向延长扩大,呈斜截状。壳顶低,不突出背缘之上,常被腐蚀^[4]。外套线明显,铰合部甚弱,无主齿,仅有弱的侧齿痕迹(附表 V)。无真正鳃水管和隔膜;育儿囊有内外 4 片鳃瓣构成,无胶质索形成,属内物种钩介幼虫形态存在差异(附表 VI)。

Distribution: 该属物种为中国特有种,分布于长江中下游地区^[4],其中中国龙骨蛭蚌(*S. carinata*)现存仅分布于江西鄱阳湖流域^[57]。

Genus *Sinohyriopsis* Starobogatov, 1970

Type species: *Sinohyriopsis cumingii* (Lea, 1852) 图 7B

Comments: 属内记录 2 种,即 *Sinohyriopsis cumingii* 和 *Sinohyriopsis schlegelii*。*S. cumingii* 为中国本地种,*S. schlegelii* 为中国引进种^[58]。基于贝壳形态以往该属物种归类于 *Hyriopsis*。直到现在国内一些分类学和生态学研究仍沿用 *Hyriopsis*,特别是一些区域物种多样性调查^[59-61]。最近很多分子系统研究,包括本研究已证实,*Hyriopsis* 隶属 Rectidentinae,主要集中在东南亚地区,包括东印度、缅甸、泰国、老挝、越南、柬埔寨、马来西亚半岛、印度尼西亚,而 *Sinohyriopsis* 则隶属 Gonideinae,主要分布在中国和日本地区^[21-22,24]。

Description: 贝壳呈三角形,大型,侧扁,壳质较厚;前端低,后端高;后背缘向上突起形成三角形的翼^[4];外套线明显,铰合部发达;壳顶不突出背缘之上(附表 V)。育儿囊为外鳃型,钩介幼虫无钩,无胶质索形成(附表 VI)。

Distribution: 该属物种广泛分布在中国长江和黄河流域,以及日本和越南^[21]。

Subfamily Unioninae Rafinesque, 1820

Genus *Lanceolaria* Conrad, 1853

Type species: *Lanceolaria grayii* (Griffith & Pidgeon, 1833)

Species: *Lanceolaria grayanus* (Lea, 1834) 图 7C

Lanceolaria lanceolata (*Arconaia lanceolata*) (Lea, 1856) 图 7D

Comments: 该属长期基于形态学研究归入 Unioninae。后来, Lopes-Lima 等^[25] 和 Wu 等^[36] 基于分子数据支持该属归类于 Anodontinae。最近,随着 Anodontinae 并到 Unioninae,该物种重新归类于 Unioninae。*Arconaia* 为中国特有属,仅包含一种,即 *Arconaia lanceolata* (Lea, 1856)。由于 *Arconaia* 与 *Lanceolaria* 物种具有更近的

表 2 中国蚌超科属阶元分类系统
Tab.2 Classification system of Chinese Unionoidea

Chinese Superfamily UNIONOIDEA Rafinesque, 1820 蚌超科
Family Unionidae Rafinesque, 1820 蚌科
Subfamily Gonideinae Ortmann, 1916 隆嵴蚌亚科
Tribe Gonideini Ortmann, 1916 隆嵴蚌族
Genus <i>Sinosolenia</i> Bolotov, Kondakov, Konopleva & Vikhrev, 2021 中国蛭蚌属
Genus <i>Parvasolenia</i> Huang et Wu, 2019 小蛭蚌属
Genus <i>Inversidens</i> Haas, 1911 倒齿蚌属
Genus <i>Ptychorhynchus</i> Simpson, 1900 锄蚌属
Tribe Lamprotulini Modell, 1942 丽蚌族
Genus <i>Lamprotula</i> Simpson, 1900 丽蚌属
Tribe Chamberlainiini Bogan, Froufe et Lopes-Lima, 2016 室蚌族
Genus <i>Sinohyriopsis</i> Starobogatov, 1970 中国帆蚌属
Genus <i>Chamberlainia</i> Simpson, 1900 室蚌属
Tribe Pseudodontini Frierson, 1927 拟齿蚌族
Genus <i>Pseudodon</i> Gould, 1844 拟齿蚌属
Genus <i>Pilsbryoconcha</i> Simpson, 1900 拟无齿蚌属
Subfamily Rectidentinae Modell, 1942 矩形蚌亚科
Tribe Rectidentini Modell, 1942 矩形蚌族
Genus <i>Ensidens</i> Frierson, 1911 剑齿蚌属
Subfamily Unioninae Rafinesque, 1820 珠蚌亚科
Tribe Cristariini Lopes-Lima, Bogan and Froufe, 2016 冠蚌族
Genus <i>Cristaria</i> Schumacher, 1817 冠蚌属
Genus <i>Anemina</i> Haas, 1969 船蚌属
Genus <i>Sinanodonta</i> Modell, 1944 中国无齿蚌属
Tribe Acuticostini Starobogatov, 1967 尖嵴蚌族
Genus <i>Acuticosta</i> Simpson, 1900 尖嵴蚌属
Tribe Lanceolariini Froufe, Lopes-Lima and Bogan, 2016 矛蚌族
Genus <i>Lanceolaria</i> Conrad, 1853 矛蚌属
Tribe Unionini Rafinesque, 1820 珠蚌族
Genus <i>Schistodesmus</i> Simpson, 1900 裂脊蚌属
Genus <i>Nodularia</i> Conrad, 1853 结节蚌属
Genus <i>Cuneopsis</i> Simpson, 1900 楔蚌属
Tribe Aculamprotulini Huang et Wu, 2019 尖丽蚌族
Genus <i>Aculamprotula</i> Wu, Liang, Wang Q Ouyang, 1999 尖丽蚌属
Tribe Lepidodesmini Huang et Wu, 2019 鳞皮蚌族
Genus <i>Lepidodesma</i> Simpson, 1896 鳞皮蚌属
Subfamily Parreysiinae Henderson 1935 雕刻蚌亚科
Tribe Indochinellini Bolotov, Pfeiffer, Vikhrev, et Konopleva, 2018 中印半岛蚌族
Genus <i>Scabies</i> Haas, 1911 糙蚌属
Tribe Leoparreysiini Vikhrev, Bolotov et Kondakov, 2017 莱昂雕刻蚌族
Genus <i>Leoparreysia</i> Vikhrev, Bolotov & Aksenova, 2017 莱昂雕刻蚌属
UNIONIDAE (incertae sedis)
* Genus <i>Pseudobaphia</i> Simpson, 1900 假柏夫蚌属
* Genus <i>Rhombuniopsis</i> Haas, 1920 菱形蚌属
Family Margaritiferidae Henderson, 1929 珍珠蚌科
Subfamily Margaritiferinae Henderson, 1929 珍珠蚌亚科
Genus <i>Margaritifera</i> Schumacher, 1816 珍珠蚌属
Subfamily Gibbosulinae Bogan, Bolotov, Froufe, Lopes-Lima, 2018 弓背蚌亚科
Genus <i>Gibbosula</i> Simpson, 1900 弓背蚌属

* 表示本研究未包括该属.

近缘关系,并形成单系群,Huang 等^[23]基于分子数据将 *Arconaia* 合并到 *Lanceolaria*,*Arconaia lanceolata* 重组为 *Lanceolaria lanceolata* comb. res.

Description: 贝壳为细长型;壳质较厚,壳顶低^[4];外套线明显,铰合齿发达(附表 V). 有真正鳃水管,瓣间隔膜完整;育儿囊为外鳃型,钩介幼虫呈三角形,有钩,属内钩介幼虫在育儿囊中发育方式不同(附表 VI).

Distribution: 该属物种主要分布于远东亚,包括俄罗斯、日本、韩国、朝鲜、中国长江流域、越南^[21].

Genus *Anemina* Haas, 1969

Type species: *Anemina arcaeformis* (Heude, 1877) 图 7E

Comments: 见 Genus *Sinanodonta*.

Description: 壳质薄,易碎;外形呈椭圆形,壳顶膨胀,突出于背缘之上;壳面呈淡黄绿色或黄褐色,有光泽,具有细弱同心圆的生长轮脉^[4];铰合部弱,无齿;外套线不明显(附表 V). 有真正鳃水管和隔膜,入水管有 2~3 行排列乳突,出水管光滑无乳突;育儿囊为外鳃型,只有外鳃瓣构成;钩介幼虫呈半圆形,有壳钩,无胶质索形成(附表 VI).

Distribution: 同 *Sinanodonta* 分布.

Genus *Sinanodonta* Modell, 1944

Type species: *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) 图 7F

Comments: *Anemina* 以 *Anemina arcaeformis* 作为模式种而命名,*Sinanodonta* 则以 *Sinanodonta woodiana* 作为模式种而命名. 由于贝壳形态相似,以往 *Sinanodonta* 和 *Anemina* 物种均归类于 *Anodonta*. 直到现在国内一些分类学和生态学研究仍沿用 *Anodonta*,特别是在一些区域多样性调查中^[59-61]. 如本研究所示,*Anodonta* 隶属 *Anodontini*; *Sinanodonta* 和 *Anemina* 为两个独立单系群,均隶属 *Cristariini*^[23]. 这两族有明显地域分布差异,*Anodonta* 主要分布于北美和西古北界地区,而中国则只有 *Sinanodonta* 和 *Anemina* 分布^[21].

Description: 壳质薄,易碎;外形呈椭圆形,壳顶不膨胀或稍膨胀,不突出于背缘之上;壳面呈淡黄绿色或黄褐色,有光泽,具有细弱同心圆的生长轮脉^[4];铰合部弱,无齿;外套线不明显(附表 V). 有真正鳃水管和隔膜,入水管有 2~3 行排列的乳突,出水管光滑无乳突;育儿囊为外鳃型,钩介幼虫呈长三角形,无胶质索形成(附表 VI).

Distribution: 广泛分布于印度支那半岛到中国、朝鲜、韩国、日本以及俄罗斯、北美等地^[21].

Genus *Nodularia* Conrad, 1853

Type species: *Nodularia douglasiae* (Griffith & Pidgeon, 1833) 图 7G

Comments: 该属以 *Nodularia douglasiae* 为模式种而建立. 以往我国该属物种归类于 *Unio*,现在一些区域多样性调查仍沿用 *Unio douglasiae*^[59-61]. 当前已有很多分子数据证实 *Nodularia* 和 *Unio* 为两个独立单系群,同时两属具有明显地域分布差异,*Unio* 主要分布于非洲热带、东亚、北美和欧亚大陆北部,*Nodularia* 仅分布于东亚,而目前中国仅发现 *Nodularia* 分布^[21,62].

Description: 贝壳卵形或长椭圆形^[4];壳质较厚,外套线明显,铰合齿发达(附表 V). 有鳃水管,瓣间隔膜不完整;入水管有 2~3 行排列的乳突,出水管有乳突;育儿囊由外鳃瓣构成,钩介幼虫呈三角形,有钩,有胶质索(附表 VI).

Distribution: 广泛分布在中国(包括台湾)、韩国、马甲丹、俄罗斯日本和库页岛^[21].

3.4 形态学和解剖学特征在蚌科属上阶元分类中的意义

以往蚌科分类特征主要包括以下方面:贝壳形态、软体部分形态、钩介幼虫形态以及某些繁殖习性. 早期 Simpson^[9] 基于贝壳形态、钩介幼虫形态和育儿囊类型将全球蚌科分为 *Unioninae* 和 *Hyriinae* 两个亚科. 后来 Ortmann^[63] 指出由于贝壳形态趋同性大,以其作为科及亚科阶元分类特征不适当,并综合其他解剖特征将北美蚌科分为 *Unioninae*、*Anodontinae*、*Lampsilinae* 三个亚科. 此后 Modell^[64] 和 Haas^[10] 基于形态学和解剖学特征对蚌科提出不同分类系统,但很大程度仍依赖贝壳形态. Heard 等^[65] 则强调解剖学和繁殖特征差异,首次将繁殖特征作为科阶元分类依据.

贝壳形态特征易受生物和非生物双重影响,如年龄、大小、性别以及生境、水文、理化因素等^[66-68]. 仅依靠或侧重于依赖贝壳形态对蚌科属上阶元分类不明智. 本研究也发现壳质、形状、铰合齿等贝壳特征并不能

图 7 中国蚌类贝壳形态(A:中国橄榄蛭蚌,B:中国三角帆蚌,C:短褶矛蚌,D:扭矛蚌,
E:蚌形船蚌,F:中国背角无齿蚌,G:圆顶结节蚌)

Fig.7 Shell morphology in Chinese unionids(A: *Sinosolenia oleivora*, B: *Sinohyriopsis cumingii*,
C: *Lanceolaria grayanus*, D: *Lanceolaria lanceolata*, E: *Anemina arcaeformis*,
F: *Sinanodonta woodiana*, G: *Nodularia douglasiae*)

作为蚌科属上阶元分类依据(附表 II)。以往钩介幼虫形态和育儿囊特征是蚌科属及属上阶元重要分类依据^[15-16,64-65]。然而,钩介幼虫形态不仅在属间存有差异,在属内也有差异。*Sinosolenia carinata* 和 *Sinosolenia oleivora* 软体部分及钩介幼虫形态有明显区别(附表 III);*S. oleivora* 进水管乳突为多分支状,出水管光滑,而 *S. carinata* 进水管和出水管均有乳突,但其乳突并没有像 *S. oleivora* 呈现尖锐状;*S. oleivora* 钩介幼虫无钩中等大小,而 *S. carinata* 钩介幼虫则有钩且小,且繁殖期也大不相同。这种属内幼虫形态差异在 *Pseudodon* 也有报道^[20]。同样,育儿囊类型不仅在属上阶元存在差异,属内种间也有差异,如 *Hyriopsis bialata* 和 *Hyriopsis desowitzi*(附表 III)。

因此,贝壳形态和解剖特征难以作为诊断各亚科的分类依据。Heard 等^[65]基于解剖学和繁殖特征数据构建北美蚌类系统发育,发现蚌类高阶元分子系统进化关系与特征演化史并不一致。本研究对中国蚌科争议属形态描述仅是基于所搜集的贝壳形态和解剖特征,并不能作为该属分类诊断依据,不排除属内其他物种出现描述之外的其他特征。Zanatta 等^[69]基于分子数据探讨了 Lampsilini 族主动寄生策略出现与消失的演化过程。或许今后研究可以尝试在系统发育框架上综合更多形态解剖学数据,包括生态特征和行为特征来探讨物种特征演化史,了解物种演化特征与生活史策略的适应性关系。

4 结论

基于多位点分子标记(COI、16S、28S)和线粒体基因组学重构聚焦于蚌超科(蚌科和珍珠蚌科)的蚌目系统发育关系,结果支持蚌科 5 亚科分类系统,即(((Ambleminae + Gonideinae) + Rectidentinae) + Unioninae) + Parreysiinae;珍珠蚌科 2 亚科分类系统,即(Gibbosulinae + Margaritiferinae)。中国蚌类 24 属隶属蚌科 4 亚科(Gonideinae、Rectidentinae、Unioninae、Parreysiinae) 13 族和珍珠蚌科两亚科(Gibbosulinae、Margaritiferinae)。蚌科物种分化时间为中三叠世,其中雕刻蚌亚科(Parreysiinae)起源和物种分化时间早于其他亚科;矩形蚌亚科(Rectidentinae)物种分化时间最晚,为晚白垩世;小方蚌亚科(Ambleminae)和隆脊蚌亚科(Gonideinae)最近共同祖先分化于晚侏罗纪世。珍珠蚌科起源于晚石炭世,物种分化于晚白垩世。中国尖嵴蚌(*Acuticosta chinensis*)可能是中国现生蚌科中起源最早的物种,可追溯到白垩纪(median = 114.36 Ma)。当前蚌超科线粒体基因组有 4 种基因排列方式,珍珠蚌科独享一种;蚌科中 Unioninae 和 Ambleminae 共享一种;Gonideinae 有 2 种基因排列方式,其中室蚌(*Chamberlainia hainesiana*)独享一种。以往作为高阶元分类的贝

武瑞文等:基于多位点分子标记和线粒体基因组学中国蚌类(蚌目:蚌超科)物种分类与系统进化研究 1801

壳形态、钩介幼虫形态以及育儿囊类型,并不能作为蚌科属及以上阶元分类依据。

5 附录

附表 I ~ VI 和附图 I 见电子版(DOI: 10.18307/2021.0615)。

6 参考文献

- [1] Bogan AE. Global diversity of freshwater mussels (Mollusca, Bivalvia) in freshwater. *Hydrobiologia*, 2008, **595**(1): 139-147. DOI: 10.1007/s10750-007-9011-7.
- [2] Graf DL, Cummings KS. Review of the systematics and global diversity of freshwater mussel species (Bivalvia: Unionoida). *Journal of Molluscan Studies*, 2007, **73**(4): 291-314. DOI: 10.1093/mollus/eym029.
- [3] Vaughn CC, Spooner DE. Unionid mussels influence macroinvertebrate assemblage structure in streams. *Journal of the North American Benthological Society*, 2006, **25**(3): 691-700. DOI: 10.1899/0887-3593(2006)25[691: umimas]2.0.co;2.
- [4] Liu YY ed. Economic animal of China: Freshwater molluscs. Beijing: Science Press, 1979. [刘月英. 中国经济动物志: 淡水软体动物. 北京: 科学出版社, 1979.]
- [5] Lydeard C, Cowie RH, Ponder WF *et al.* The global decline of nonmarine mollusks. *BioScience*, 2004, **54**(4): 321-330. DOI: 10.1641/0006-3568(2004)054[0321: TGDONM]2.0.CO;2.
- [6] Bogan AE. Freshwater bivalve extinctions (Mollusca: Unionoida) search for causes. *Integrative and Comparative Biology*, 1993, **33**(6): 599-609. DOI: 10.1093/ich/33.6.599.
- [7] Zieritz A, Bogan AE, Froufe E *et al.* Diversity, biogeography and conservation of freshwater mussels (Bivalvia: Unionida) in East and Southeast Asia. *Hydrobiologia*, 2018, **810**(1): 29-44. DOI: 10.1007/s10750-017-3104-8.
- [8] Heude P ed. Conchyliologie fluviatile de la Province de Nanking et de la Chine centrale. Paris: Savy, 1875. DOI: 10.5962/bhl.title.14450.
- [9] Simpson CT. Synopsis of the Naiades; or pearly fresh-water mussels. US Government Printing Office, 1900.
- [10] Haas F ed. Superfamilia unionacea. de Gruyter, 1969.
- [11] Zhang X, Li SC. Bivalves from Poyang Lake and its surrounding waters include a new species. *Acta Zoologica Sinica*, 1965, **17**(3): 309-317. [张玺, 李世成. 鄱阳湖及其周围水域的双壳类包括一新种. 动物学报, 1965, **17**(3): 309-317.]
- [12] Lin ZT. Unionidae (Mollusca) of Poyang Lake, Jiangxi province, China. *Acta Zoologica Sinica*, 1962, **14**(2): 249-260. [林振涛. 鄱阳湖的蚌类. 动物学报, 1962, **14**(2): 249-260.]
- [13] Liu YY, Zhang WZ, Wang YX. Bivalves (Mollusca) of the Taihu and its surrounding waters, Jiangsu province, China. *Acta Zoologica Sinica*, 1980, (4): 365-369. [刘月英, 张文珍, 王跃先. 太湖及其周围水域的双壳类. 动物学报, 1980, (4): 365-369.]
- [14] Liu YY, Zhang WZ, Wang YX *et al.* New records of Chinese freshwater clams. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 1979, **4**(2): 188. [刘月英, 张文珍, 王耀先等. 我国蚌类新纪录. 动物分类学报, 1979, **4**(2): 188.]
- [15] Wu XP, Liang YL, Wang HZ. A comparative study on glochidial morphology of Unionidae (Bivalvia) I. *Unio douglasiae*, *Cuneopsis pisciulus*, *Acuticosta chinensis* and *Acuticosta ovata*. *Acta Hydrobiologica Sinica*, 1999, **23**(2): 141-145. [吴小平, 梁彦龄, 王洪铸等. 蚌科钩介幼虫比较形态学研究——I. 四个种幼虫的形态. 水生生物学报, 1999, **23**(2): 141-145.]
- [16] Wu XP, Liang YL, Wang HZ *et al.* A comparative study on glochidial morphology of Unionidae (Bivalvia). *Acta Hydrobiologica Sinica*, 2000, **24**(3): 252-256. [吴小平, 梁彦龄, 王洪铸等. 蚌科钩介幼虫的比较形态学研究 II. 六个种幼虫的形态. 水生生物学报, 2000, **24**(3): 252-256.]
- [17] Wen HB, Ma XY, Xu P *et al.* Artificial selection of host fish and parasitic cyst formation of glochidia in pink heelsplitter, *Potamilus alatus*. *Acta Hydrobiologica Sinica*, 2018, **42**(2): 356-363. DOI: 10.7541/2018.045. [闻海波, 马学艳, 徐跑等. 紫黑翼蚌钩介幼虫寄生主鱼的人工筛选及寄生包囊形成观察. 水生生物学报, 2018, **42**(2): 356-363.]
- [18] Xu L, Wu XP, Ling G *et al.* Reproductive traits and glochidium morphology of *Lamprotula lei*(Gray). *Journal of Nanchang University: Natural Science*, 2013, **37**(3): 262-266. [徐亮, 吴小平, 凌高等. 背瘤丽蚌繁殖特征及钩介幼虫

- 形态. 南昌大学学报: 理科版, 2013, **37**(3): 262-266.]
- [19] Whelan NV, Geneva AJ, Graf DL. Molecular phylogenetic analysis of tropical freshwater mussels (Mollusca: Bivalvia) resolves the position of *Coelatura* and supports a monophyletic Unionidae. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2011, **61**(2): 504-514. DOI: 10.1016/j.ympev.2011.07.016.
- [20] Pfeiffer III JM, Graf DL. Evolution of bilaterally asymmetrical larvae in freshwater mussels (Bivalvia: Unionoida). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2015, **175**(2): 307-318. DOI: 10.1111/zoj.12282.
- [21] Lopes-Lima M, Froufe E, Do VT *et al.* Phylogeny of the most species-rich freshwater bivalve family (Bivalvia: Unionida) modern subfamilies and tribes. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2017, **106**: 174-191. DOI: 10.1016/j.ympev.2016.08.021.
- [22] Bolotov IN, Vikhrev IV, Kondakov AV *et al.* New taxa of freshwater mussels (Unionidae) from a species-rich but overlooked evolutionary hotspot in Southeast Asia. *Scientific Reports*, 2017, **7**: 11573. DOI: 10.1038/s41598-017-11957-9.
- [23] Huang XC, Su JH, Ouyang JX *et al.* Towards a global phylogeny of freshwater mussels (Bivalvia: Unionida) delimitation of Chinese taxa, mitochondrial phylogenomics, and diversification patterns. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2019, **130**: 45-59. DOI: 10.1016/j.ympev.2018.09.019.
- [24] Pfeiffer JM, Breinholt JW, Page LM. Unioverse: A phylogenomic resource for reconstructing the evolution of freshwater mussels (Bivalvia, Unionoida). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2019, **137**: 114-126. DOI: 10.1016/j.ympev.2019.02.016.
- [25] Lopes-Lima M, Bolotov IN, Do VT *et al.* Expansion and systematics redefinition of the most threatened freshwater mussel family, the Margaritiferidae. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2018, **127**: 98-118. DOI: 10.1016/j.ympev.2018.04.041.
- [26] Bolotov IN, Vikhrev IV, Beshpalaya YV *et al.* Multi-locus fossil-calibrated phylogeny, biogeography and a subgeneric revision of the Margaritiferidae (Mollusca: Bivalvia). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2016, **103**: 104-121. DOI: 10.1016/j.ympev.2016.07.020.
- [27] Araujo R, Schneider S, Roe KJ *et al.* The origin and phylogeny of Margaritiferidae (Bivalvia, Unionoida): A synthesis of molecular and fossil data. *Zoologica Scripta*, 2017, **46**(3): 289-307. DOI: 10.1111/zsc.12217.
- [28] Huang XC, Rong J, Liu Y *et al.* The complete maternally and paternally inherited mitochondrial genomes of the endangered freshwater mussel *Solenia carinatus* (Bivalvia: Unionidae) and implications for Unionidae taxonomy. *PLoS One*, 2013, **8**(12): e84352. DOI: 10.1371/journal.pone.0084352.
- [29] Zhou CH, Ouyang S, Wu XP *et al.* Phylogeny of the genus *Lamprotula* (Unionidae) in China based on mitochondrial DNA sequences of 16S rRNA and ND1 genes. *Acta Zoologica Sinica*, 2007, **53**(6): 1024-1030. [周春花, 欧阳珊, 吴小平等. 基于 16S rRNA 和 ND1 基因序列的中国蚌科丽蚌属的系统发育. 动物学报, 2007, **53**(6): 1024-1030.]
- [30] Song XL, Ouyang S, Zhou CH *et al.* Complete maternal mitochondrial genome of freshwater mussel *Anodonta lucida* (Bivalvia: Unionidae). *Mitochondrial DNA Part A*, 2016, **27**(1): 549-550. DOI: 10.3109/19401736.2014.905852.
- [31] Wu RW, An CT, Wu XP *et al.* Complete maternal mitochondrial genome of freshwater mussel *Aculamprotula tientsinensis* (Bivalvia: Unionidae). *Mitochondrial DNA Part A, DNA Mapping, Sequencing, and Analysis*, 2016, **27**(6): 4520-4521. DOI: 10.3109/19401736.2015.1101543.
- [32] Wang GL, Guo LP, Li JL. The F-type complete mitochondrial genome of *Arconaia lanceolata*. *Mitochondrial DNA Part A*, 2016, **27**(1): 322-323. DOI: 10.3109/19401736.2014.892098.
- [33] Huang YY, Liu HZ, Wu XP *et al.* Testing the relationships of Chinese freshwater Unionidae (bivalvia) based on analysis of partial mitochondrial 16S rRNA sequences. *Journal of Molluscan Studies*, 2002, **68**(4): 359-363. DOI: 10.1093/mol-lus/68.4.359.
- [34] Ouyang JX, Wu XP, Shan O *et al.* Phylogenetic analysis of some Chinese freshwater Unionidae based on mitochondrial COI sequences. *Journal of Conchology*, 2011, **40**(5): 543-548.
- [35] Ouyang JX, Su JH, Ouyang S *et al.* DNA barcoding and molecular phylogenetic analysis of freshwater unionids. *Journal of Agricultural Biotechnology*, 2015, **23**(6): 779-787. [欧阳解秀, 苏金荟, 欧阳珊等. 蚌科 DNA 条形码识别与系统发育分析. 农业生物技术学报, 2015, **23**(6): 779-787.]
- [36] Wu RW, Liu XJ, Wang S *et al.* Analysis of mitochondrial genomes resolves the phylogenetic position of Chinese freshwater mussels (Bivalvia, Unionidae). *Zoo Keys*, 2019, (812): 23-46. DOI: 10.3897/zookeys.812.29908.

- [37] Tamura K, Peterson D, Peterson N *et al.* MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. *Molecular Biology and Evolution*, 2011, **28**(10): 2731-2739. DOI: 10.1093/molbev/msr121.
- [38] Katoh K, Standley DM. MAFFT multiple sequence alignment software version 7: Improvements in performance and usability. *Molecular Biology and Evolution*, 2013, **30**(4): 772-780. DOI: 10.1093/molbev/mst010.
- [39] Castresana J. Selection of conserved blocks from multiple alignments for their use in phylogenetic analysis. *Molecular Biology and Evolution*, 2000, **17**(4): 540-552. DOI: 10.1093/oxfordjournals.molbev.a026334.
- [40] Vaidya G, Lohman DJ, Meier R. Sequence Matrix: concatenation software for the fast assembly of multi-gene datasets with character set and Codon information. *Cladistics*, 2011, **27**(2): 171-180. DOI: 10.1111/j.1096-0031.2010.00329.x.
- [41] Zhang D, Gao FL, Jakovlić I *et al.* PhyloSuite: An integrated and scalable desktop platform for streamlined molecular sequence data management and evolutionary phylogenetics studies. *Molecular Ecology Resources*, 2020, **20**(1): 348-355. DOI: 10.1111/1755-0998.13096.
- [42] Huang Y ed. Molecular Phylogenetics. Beijing: Science Press, 2012. [黄原. 分子系统发生学. 北京: 科学出版社, 2012.]
- [43] Lanfear R, Calcott B, Ho SYW *et al.* PartitionFinder: combined selection of partitioning schemes and substitution models for phylogenetic analyses. *Molecular Biology and Evolution*, 2012, **29**(6): 1695-1701. DOI: 10.1093/molbev/mss020.
- [44] Kalyanamoorthy S, Minh BQ, Wong TKF *et al.* ModelFinder: fast model selection for accurate phylogenetic estimates. *Nature Methods*, 2017, **14**(6): 587-589. DOI: 10.1038/nmeth.4285.
- [45] Ronquist F, Teslenko M, van der Mark P *et al.* MrBayes 3.2: Efficient Bayesian phylogenetic inference and model choice across a large model space. *Systematic Biology*, 2012, **61**(3): 539-542. DOI: 10.1093/sysbio/sys029.
- [46] Nguyen LT, Schmidt HA, von Haeseler A *et al.* IQ-TREE: A fast and effective stochastic algorithm for estimating maximum-likelihood phylogenies. *Molecular Biology and Evolution*, 2015, **32**(1): 268-274. DOI: 10.1093/molbev/msu300.
- [47] Hu F, Lin Y, Tang J. MLGO: phylogeny reconstruction and ancestral inference from gene-order data. *BMC Bioinformatics*, 2014, **15**: 354.
- [48] Bernt M, Merkle D, Ramsch K *et al.* CREx: inferring genomic rearrangements based on common intervals. *Bioinformatics*, 2007, **23**(21): 2957-2958. DOI: 10.1093/bioinformatics/btm468.
- [49] Drummond AJ, Suchard MA, Xie D *et al.* Bayesian phylogenetics with BEAUti and the BEAST 1.7. *Molecular Biology and Evolution*, 2012, **29**(8): 1969-1973. DOI: 10.1093/molbev/mss075.
- [50] Bieler R, Mikkelsen PM, Collins TM *et al.* Investigating the Bivalve Tree of Life—an exemplar-based approach combining molecular and novel morphological characters. *Invertebrate Systematics*, 2014, **28**(1): 32-115.
- [51] Wu RW, Liu XJ, Ouyang S *et al.* Comparative analyses of the complete mitochondrial genomes of three *Lamprotula* (Bivalvia: Unionidae) species: insight into the shortcomings of mitochondrial DNA for recently diverged species delimitation. *Malacologia*, 2020, **63**(1): 51-66.
- [52] Graf DL, Jones H, Geneva AJ *et al.* Molecular phylogenetic analysis supports a Gondwanan origin of the Hyriidae (Mollusca: Bivalvia) and the paraphyly of Australasian taxa. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2015, **85**: 1-9. DOI: 10.1016/j.ympev.2015.01.012.
- [53] Huang XC, Wu RW, An CT *et al.* Reclassification of *Lamprotula rochechouartii* as *Margaritifera rochechouartii* comb. nov. (Bivalvia: Margaritiferidae) revealed by time-calibrated multi-locus phylogenetic analyses and mitochondrial phylogenomics of Unionoida. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2018, **120**: 297-306. DOI: 10.1016/j.ympev.2017.12.017.
- [54] Wu RW, Liu YT, Wang S *et al.* Testing the utility of DNA barcodes and a preliminary phylogenetic framework for Chinese freshwater mussels (Bivalvia: Unionidae) from the middle and lower Yangtze River. *PLoS One*, 2018, **13**(8): e0200956. DOI: 10.1371/journal.pone.0200956.
- [55] Wu RW, Wang S, Liu YT *et al.* Characterization and phylogenetic analysis of the complete maternal mitochondrial genome of freshwater mussel *Aculamprotula scripta* (Bivalvia: Unionidae). *Conservation Genetics Resources*, 2018, **10**(4): 731-733. DOI: 10.1007/s12686-017-0914-y.
- [56] Bolotov IN, Kondakov AV, Konopleva ES *et al.* A new genus of ultra-elongate freshwater mussels from Vietnam and Eastern China (Bivalvia: Unionidae). *Ecologica Montenegrina*, 2021, **39**: 1-6. DOI: 10.37828/em.2021.39.1.

- [57] Cao YL, Liu XJ, Wu RW *et al.* Conservation of the endangered freshwater mussel *Solenia carinata* (Bivalvia, Unionidae) in China. *Nature Conservation*, 2018, **26**: 33-53. DOI: 10.3897/natureconservation.26.25334.
- [58] Dong ZG, Li XY, Li JL. Tolerance of alien species *Hyriopsis schlegeli*, native species *Hyriopsis cumingii*, and their hybrids to three ecological factors. *Chinese Journal of Ecology*, 2007, **26**(7): 1080-1084. [董志国, 李晓英, 李家乐. 外来种池蝶蚌与本地种三角帆蚌及其杂交种对三种生态因子的耐受力. 生态学杂志, 2007, **26**(7): 1080-1084.]
- [59] Zhan XD, Wang SS, Huang YE *et al.* Species of freshwater mussels in Anhui Province. *Journal of Jishou University: Natural Sciences Edition*, 2018, **39**(1): 65-67. [湛孝东, 王少圣, 黄月娥等. 安徽省淡水蚌类初步调查. 吉首大学学报: 自然科学版, 2018, **39**(1): 65-67.]
- [60] Xue TT, Liu XJ, Wu RW *et al.* Standing stock and spatial distribution pattern of unionids in Lake Taihu, China. *J Lake Sci*, 2019, **31**(1): 202-210. DOI: 10.18307/2019.0119. [薛涛涛, 刘雄军, 武瑞文等. 太湖蚌类现存量及空间分布格局. 湖泊科学, 2019, **31**(1): 202-210.]
- [61] Wu RW, Gao BY, Lan ZC *et al.* Predicting local colonization and extinction rates of freshwater mussels based on biological traits in a case of Lake Poyang. *J Lake Sci*, 2017, **29**(3): 678-686. DOI: 10.18307/2017.0317. [武瑞文, 高博宇, 兰志春等. 基于淡水蚌类的生物学特征预测种群局部定居率和灭绝率——以鄱阳湖为例. 湖泊科学, 2017, **29**(3): 678-686.]
- [62] Klishko OK, Lopes-Lima M, Froufe E *et al.* Unravelling the systematics of *Nodularia* (Bivalvia, Unionidae) species from eastern Russia. *Systematics and Biodiversity*, 2018, **16**(3): 287-301. DOI: 10.1080/14772000.2017.1383527.
- [63] Ortmann AE. Notes upon the families and genera of the Najades. *Annals of Carnegie Museum*, 1912.
- [64] Modell H. Das natürliche System der Najaden. *Archiv für Molluskenkunde*, 1942, **74**(5/6): 161-191.
- [65] Heard WH, Guckert RH. A re-evaluation of the recent Unionacea (Pelecypoda) of North America. *Malacologia*, 1970, **10**(2): 333-355.
- [66] Zieritz A, Hoffman JI, Amos W *et al.* Phenotypic plasticity and genetic isolation-by-distance in the freshwater mussel *Unio pictorum* (Mollusca: Unionoida). *Evolutionary Ecology*, 2010, **24**(4): 923-938. DOI: 10.1007/s10682-009-9350-0.
- [67] Hornbach DJ, Kurth VJ, Hove MC. Variation in freshwater mussel shell sculpture and shape along a river gradient. *American Midland Naturalist*, 2010, **164**(1): 22-37.
- [68] Inoue K, Hayes DM, Harris JL *et al.* Phylogenetic and morphometric analyses reveal ecophenotypic plasticity in freshwater mussels *Obovaria jacksoniana* and *Villosa arkansasensis* (Bivalvia: Unionidae). *Ecology and Evolution*, 2013, **3**(8): 2670-2683. DOI: 10.1002/ece3.649.
- [69] Zanatta DT, Murphy RW. Evolution of active host-attraction strategies in the freshwater mussel tribe Lampsilini (Bivalvia: Unionidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2006, **41**(1): 195-208. DOI: 10.1016/j.ympev.2006.05.030.

附表 I 本研究用于构建多位点联合数据集的序列号

Attached Tab. I List of sequences used in this study

Taxa	COI	16S rRNA	28S rDNA	Note
Ingroup Taxa				
Unionidae Rafinesque, 1820				
Parreysiinae Henderson, 1935				
Lamellidentini Modell, 1942				
<i>Trapezidens exolescens</i> (Gould, 1843)	KX230532	KX230548	KX230559	
<i>Lamellidens generosus</i> (Gould, 1847)	KX230544	KX230555	KX230566	
<i>Lamellidens brandti</i>	MF352219	MF352293	MF352351	
<i>Lamellidens</i> sp.	KX865825	KX865596	KX865699	
Leoparreysiini Vikhrev, Bolotov et Kondakov, 2017				
<i>Leoparreysia olivacea</i> (Prashad, 1930)	KP795022	KP795044	KP795005	中国属
<i>Leoparreysia canefrii</i>	MF352237	MF352307	MF352365	中国属
<i>Leoparreysia tavoyensis</i> (Gould, 1843)	MF352280	MF352343	MF352400	中国属
Coelaturini Modell, 1942				
<i>Coelatura aegyptiaca</i> (Cailliaud, 1827)	JN243894	KP795045	JN243872	
Indochinellini Bolotov, Pfeiffer, Vikhrev, et Konopleva, 2018				
<i>Indonaia andersoniana</i> (Nevill, 1877)	KX865835	KX865606	KX865709	
<i>Radiatula mouhoti</i>	MF352234	MF352305	MF352363	
<i>Radiatula</i> sp.	MF352266 SP	MF352330	MF352390	
<i>Radiatula burmana</i> (Blanford, 1869)	KX865838	KX865609	KX865710	
<i>Scabies crispata</i>	MH350921	KX713253	MH350970	中国种
Rectidentinae Modell, 1942				
Contradentini Modell, 1942				
<i>Physunio</i> sp.1	KX865938	KX865686	KX865809	
<i>Physunio</i> sp.2	KX865883	KX865654	KX865754	
<i>Contradens</i> sp.1	KX865906	KX865663	KX865777	
<i>Contradens</i> sp.2	KX865909	KX865666	KX865780	
Rectidentini Modell, 1942				
<i>Ensidens sagittarius</i> (Lea, 1856)	KP795033	KP795053	KP795015	中国属
<i>Ensidens</i> sp.1	KX865942	KX865690	KX865813	中国属
<i>Ensidens</i> sp.2	KX865945	KX865693	KX865816	中国属
<i>Hyriopsis desowitzi</i> Brandt, 1974	KX822644	KU318351	KX822601	
Unioninae Rafinesque, 1820				
Aculamprotulini Huang et Wu, 2019				
<i>Aculamprotula scripta</i> (Heude, 1875)	MF991456	MF991456	MG595440	中国种
<i>Aculamprotula tientsinensis</i> (Crosse & Debeaux, 1863)	NC_029210	NC_029210	MG595437	中国种
<i>Aculamprotula tortuosa</i> (Lea, 1865)	NC_021404	NC_021404	MG595442	中国种
Acuticostini Starobogatov, 1967				
<i>Acuticosta chinensis</i> (Lea, 1868)	MG462919	AY297466	MG595446	中国种
Lanceolariini Froufe, Lopes-lima et Bogan, 2016				
<i>Lanceolaria gladiola</i> (Heude, 1877)	KY067441	KY067441	MG595534	中国种
<i>Lanceolaria grayana</i> (Lea, 1834)	NC_026686	NC_026686	MG595536	中国种
<i>Lanceolaria lanceolata</i> (Lea, 1856)	NC_023955	NC_023955	MG595477	中国种
Lepidodesmini Huang et Wu, 2019				
<i>Lepidodesma languilati</i> (Heude, 1874)	NC_029491	NC_029491	MG595543	中国种

续附表 I

Taxa	COI	16S rRNA	28S rDNA	Note
Unionini Rafinesque, 1820				
<i>Cuneopsis heudei</i> (Heude, 1874)	MG462974	AY297472	MG595498	中国种
<i>Cuneopsis pisciculus</i> (Heude, 1874)	NC_026306	NC_026306	MG595503	中国种
<i>Cuneopsis rufescens</i> (Heude, 1874)	MG462982	AY297473	MG595510	中国种
<i>Nodularia douglasiae</i> (Griffith & Pidgeon, 1833)	NC_026111	NC_026111	MG595558	中国种
<i>Schistodesmus lampreyanus</i> (Baird & Adams, 1867)	MG463038	AF389410	MG595565	中国种
<i>Schistodesmus spinosus</i> (Simpson, 1900)	MG463045	AY297468	MG595572	中国种
<i>Unio pictorum</i> (Linnaeus, 1758)	KC429109	NC_015310	KC429447	
<i>Unio tumidus</i> Philipsson, 1788	KX822672	KY021076	KX822630	
Anodontini Rafinesque, 1820				
<i>Anodonta anatina</i> (Linnaeus, 1758)	KX822632	NC_022803	KX822588	
<i>Anodonta cygnea</i> (Linnaeus, 1758)	KX822633	JQ253863	KX822589	
<i>Lasmigona compressa</i> (Lea, 1829)	AF156503	NC_015481	DQ191414	
<i>Pseudanodonta complanata</i> (Rossmässler, 1835)	KX822661	JQ253868	KX822617	
<i>Pyganodon grandis</i> (Say, 1829)	AF231734	NC_013661	AF305384	
<i>Strophitus undulatus</i> (Say, 1817)	AF156505	AY238491	DQ191415	
Cristariini Lopes-Lima, Bogan et Froufe, 2016				
<i>Anemina arcaeiformis</i> (Heude, 1877)	NC_026674	NC_026674	MG595457	中国种
<i>Cristaria plicata</i> (Leach, 1814)	NC_012716	NC_012716	MG595484	中国种
<i>Sinanodonta lucida</i> (Heude, 1877)	KX822667	NC_026673	KX822624	中国种
<i>Sinanodonta woodiana</i> spp. complex 1	HQ283346	HQ283346	MG595604	中国种
Gonideinae Ortmann, 1916				
Pseudodontini Frierson, 1927				
<i>Pseudodon</i> sp.	KX865858	KX865629	KX865730	中国属
<i>Pseudodon bogani</i>	MF352216	MF352290	MF352348	中国属
<i>Pseudodon manueli</i>	MF352228	MF352300	MF352358	中国属
<i>Monodontina cambodjensis</i> (Petit de la Saussaye, 1865)	KP795028	KF011262	KP795011	
<i>Pilsbryconcha</i> sp.	KX865872	KX865643	KX865744	中国属
<i>Pilsbryconcha exilis</i> (Lea, 1838)	KP795024	KP795049	KP795007	中国属
Chamberlainiini Bogan, Froufe et Lopes-Lima, 2016				
<i>Chamberlainia hainesiana</i> (Lea, 1856)	KX822635	NC_044110	KX822592	中国种
<i>Sinohyriopsis cumingii</i> (Lea, 1852)	NC_011763	NC_011763	MG595614	中国种
<i>Sinohyriopsis schlegelii</i> (Martens, 1861)	NC_015110	NC_015110	LC519070	
Lamprotulini Modell, 1942				
<i>Lamprotula caveata</i> (Heude, 1877)	KX822646	NC_030336	KX822603	中国种
<i>Lamprotula leaii</i> (Griffith & Pidgeon, 1833)	NC_023346	NC_023346	MG595524	中国种
<i>Potomida littoralis</i> (Cuvier, 1798)	JN243905	NC_030073	JN243883	
<i>Pronodularia japonensis</i> (Lea, 1859)	KX822659	AB055625	KX822615	
Gonideini Ortmann, 1916				
<i>Gonidea angulata</i> (Lea, 1838)	DQ272371	KF011258	AF400691	
<i>Leguminaia wheatleyi</i> (Lea, 1862)	KX822651	KU946324	KX822608	
<i>Microcondylaea bonellii</i> (A. Ferussac, 1827)	KX822652	KP218021	KX822609	
<i>Sinosolenia carinata</i> (Heude, 1877)	KX822669	NC_023250	KX822626	中国种
<i>Inversidens brandtii</i>	MT020598	LC455726	LC519069	中国属
<i>Sinosolenia oleivora</i> (Heude, 1877)	KX822670	NC_022701	KX822627	中国种
<i>Ptychorhynchus pfisteri</i> (Heude, 1874)	KY067440	KY067440	MG595562	中国种
<i>Parvasolenia rivularis</i> (Heude, 1877)	KX966393	KX966393	MG595632	中国种

续附表 I

Taxa	COI	16S rRNA	28S rDNA	Note
Ambleminae Rafinesque, 1820				
Lampsilini Ihering, 1901				
<i>Lampsilis cardium</i> Rafinesque, 1820	AF120653	KX713226	AF305386	
<i>Obliquaria reflexa</i> Rafinesque, 1820	GU085300	AY655055	AF400689	
<i>Potamilus alatus</i> (Say, 1817)	KP795037	KU559011	KP795019	
<i>Truncilla truncata</i> Rafinesque, 1820	AF156513	AY655080	DQ191419	
Pleurobemini Hannibal, 1912				
<i>Elliptio complanata</i> (Lightfoot, 1786)	EU448173	DQ094144	JF899181	
Quadrulini Ihering, 1901				
<i>Quadrula quadrula</i> (Rafinesque, 1820)	AF156511	NC_013658	DQ191417	
Margaritiferidae Henderson, 1929				
<i>Gibbosula laosensis</i> (Lea, 1863)	JX497731	KC845943	KT343741	中国属
<i>Margaritifera dahurica</i> (Middendorff, 1850)	KJ161516	KJ943526	KT343747	中国种
<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	KX550089	KX550091	KX550093	
<i>Margaritifera laevis</i> (Haas, 1910)	KJ161500	KJ943523	KT343742	
<i>Margaritifera middendorffi</i> (Rosén, 1926)	KJ161547	KJ943528	KT343745	
<i>Cumberlandia monodonta</i> (Say, 1829)	AY579131	AY579089	AF305382	
<i>Pseudunio homsensis</i> (Lea, 1865)	KX550090	KX550092	KX550094	
Iridinidae Swainson, 1840				
<i>Aspatharia pfeifferiana</i> (Bernardi, 1860)	KC429107	KC429264	JN243863	
<i>Chambardia wahlbergi</i> (Krauss, 1848)	JN243886	KP184845	JN243864	
Etheriidae Deshayes, 1832				
<i>Etheria elliptica</i> Lamarck, 1807	KP184897	KP184847	KP184873	
Mycetopodidae Gray, 1840				
<i>Lamproscapha ensiformis</i> (Spix & Wagner, 1827)	KX713471	KX713225	KP795004	
<i>Anodontites elongata</i> (Swainson, 1823)	KX713444	KX713190	JN243866	
Hyriidae Swainson, 1840				
<i>Alathyria jacksoni</i> Iredale, 1934	KP184912	KP184864	KP184888	
<i>Castalia ambigua</i> Lamarck, 1819	JN243889	KP184848	JN243867	
<i>Diplodon demeraraensis</i>	KP184898	KP184849	KP184874	
Outroup Taxa				
Trigoniidae Lamarck, 1819				
<i>Neotrigonia margaritacea</i> (Lamarck, 1804)	KP068122	KX713243	KP068171	
<i>Neotrigonia lamareckii</i> (Gray, 1838)	KC429105	KC429262	KC429443	

附表 II 用于系统发育分析的 mtDNA 数据集和对应登录号*
Attached Tab. II mtDNA sequence used for molecular analyses and corresponding
GenBank numbers

科	亚科	分类单元	登录号		
Unionidae	Ambleminae	<i>Lampsilis ornata</i>	F-type	NC_005335	AY365193
		<i>Lampsilis cardium</i>	F-type	BK010478	
		<i>Leptodea leptodon</i>	F-type	NC_028522	KT723012
		<i>Potamilus alatus</i>	F-type	KU559011	
		<i>Quadrula quadrula</i>	F-type	NC_013658	FJ809750
		<i>Toxolasma parvum</i>	F-type	NC_015483	HM856639
		<i>Venustaconcha ellipsiformis</i>	F-type	FJ809753	
		<i>Leaunio lienosus</i>	F-type	BK010479	
		<i>Uniomereus tetralasmus</i>	F-type	BK010480	
		<i>Elliptio complanata</i>	F-type	BK010477	
		<i>Popenaia popeii</i>	F-type	NC_050058	MT648776
		<i>Pleurobema oviforme</i>	F-type	NC_050057	MT648775
		<i>Ambelma plicata</i>	F-type	NC_050056	MT648774
		<i>Lampsilis siliquoidea</i>	F-type	NC_037721	MF326973
		<i>Lampsilis powellii</i>	F-type	NC_037720	MF326971
	Gonideinae	<i>Ptychorhynchus pfisteri</i>	F-type	KY067440	
		<i>Sinosolenaia carinata</i>	F-type	NC_023250	KC848654
		<i>Sinosolenaia oleivora</i>	F-type	NC_022701	KF2969320
		<i>Lamprotula leaii</i>	F-type	NC_023346	JQ691662
		<i>Potomida littoralis</i>	F-type	NC_030073	KT247374
		<i>Pronodularia japonensis</i>	F-type	AB055625	
		<i>Sinohyriopsis cumingii</i>	F-type	NC_011763	FJ529186
		<i>Sinohyriopsis schlegelii</i>	F-type	NC_015110	HQ641406
		<i>Lamprotula caveata</i>	F-type	NC_030336	KX060991
		<i>Parvasolenaia rivularis</i>	F-type	NC_039839	KX966393
		<i>Pilsbryconcha exilis</i>	F-type	NC_044124	MK994776
		<i>Monodontina vondembuschiana</i>	F-type	NC_044112	MK994774
		<i>Chamberlainia hainesiana</i>	F-type	NC_044110	MK994770
		<i>Microcondylaea bonellii</i>	F-type	NC_044111	MK994772
	Unioninae	<i>Aculamprotula tientsinensis</i>	F-type	NC_029210	KR873102
		<i>Aculamprotula scripta</i>	F-type	NC_045529	MF991456
		<i>Anemina arcaeformis</i>	F-type	NC_026674	KF667530
		<i>Lepidodesma languilati</i>	F-type	NC_029491	KT381195
		<i>Aculamprotula coreana</i>	F-type	NC_026035	JX050180
		<i>Aculamprotula tortuosa</i>	F-type	NC_021404	KC109779
		<i>Aculamprotula polysticta</i>	F-type	MK728823	
		<i>Anemina euscaphys</i>	F-type	NC_026792	KP187851
		<i>Anodonta cygnea</i>	F-type	NC_036488	MG385135
		<i>Anodonta anatina</i>	F-type	NC_022803	KF030964
		<i>Lanceolaria lanceolata</i>	F-type	NC_023955	KJ144818
		<i>Cuneopsis pisciculus</i>	F-type	NC_026306	KP273584
		<i>Lanceolaria grayana</i>	F-type	NC_026686	KJ495725
		<i>Lanceolaria gladiola</i>	F-type	KY067441	
		<i>Lasmigona compressa</i>	F-type	NC_015481	HM856638

续附表 II

科	亚科	分类单元	登录号		
		<i>Nodularia douglasiae</i>	F-type	NC_026111	KM657954
		<i>Pyganodon grandis</i>	F-type	NC_013661	FJ809754
		<i>Sinanodonta lucida</i>	F-type	NC_026673	KF667529
		<i>Sinanodonta woodiana</i>	F-type	HQ283346	
		<i>Unio crassus</i>	F-type	KY290446	
		<i>Unio delphinus</i>	F-type	NC_033854	KT326917
		<i>Unio pictorum</i>	F-type	NC_015310	HM014130
		<i>Unio tumidus</i>	F-type	KY021076	
		<i>Nodularia douglasiae</i>	F-type	KM657954	
		<i>Utterbackia imbecillis</i>	F-type	NC_015479	HM856637
		<i>Utterbackia peninsularis</i>	F-type	HM856636	
		<i>Acuticosta chinensis</i>	F-type	NC_042472	MH919390
		<i>Cristaria plicata</i>	F-type	KM233451	
		<i>Schistodesmus lampreyanus</i>	F-type	NC_042470	MH919388
		<i>Cuneopsis heudei</i>	F-type	NC_042471	MH919389
		<i>Cuneopsis capitata</i>	F-type	NC_042469	MH919387
		<i>Alasmidonta varicosa</i>	F-type	NC_038155	MG938673
		<i>Alasmidonta heterodon</i>	F-type	NC_037431	MG905826
		<i>Lasmigona subviridis</i>	F-type	HM856640	
		<i>Nodularia breviconcha</i>	F-type	MT955592	
Margaritiferidae	Gibbosulinae	<i>Gibbosula crassa</i>	F-type	NC_037942	
		<i>Gibbosula rochechouartii</i>	F-type	KX378172	
	Margaritiferinae	<i>Margaritifera falcata</i>	F-type	NC_015476	HM856634
		<i>Cumberlandia monodonta</i>	F-type	NC_034846	KU873123
		<i>Margaritifera dahurica</i>	F-type	NC_023942	KF514426
		<i>Pseudunio marocanus</i>	F-type	NC_034911	KY131953
		<i>Margaritifera margaritifera</i>	F-type	KY996745	
Hyriidae		<i>Echydella menziesii</i>	F-type	NC_034845	KU873121
Iridinidae		<i>Mutela dubia</i>	F-type	NC_034844	KU873120
Mycetopodidae		<i>Anodontites trapesialis</i>	F-type	KU873119	
Trigoniidae		<i>Neotrigonia margaritacea</i>	F-type	NC_034843	KU873118
In quesetion		<i>Lamprotula gottschei</i>	F-type	NC_023806	KJ018924
		<i>Lamprotula scripta</i>	F-type	NC_030258	KU745294

* 黑色加粗为中国蚌种,红色表示有疑问的序列.

附表Ⅲ 基于 Moder Finder 和 Partition Finder 对多位点联合数据集，
线粒体 AA 数据集和 NUC 筛选的分区方案和最适模型

Attached Tab.Ⅲ Partitioning strategies from Moder Finder and Partition Finder for
three locus dataset, mt AA dataset and mt NUC dataset

Moder Finder for three locus dataset	Partition Finder for three locus dataset
TIM2+F+I+G4, COX1_codon1	GTR+I+G, cox1_codon1
F81+F+I+G4, COX1_codon2	F81+I, cox1_codon2
TIM2+F+G4, COX1_codon3	GTR+G, cox1_codon3
TIM2+F+I+G4; 16S	GTR+I+G, 16S
TIM2+F+G4; 28S	GTR+G, 28S
Moder Finder AA dataset	Partition Finder for AA dataset
mtVer+I+G4;nad1	MTMAM+I+G;nad1
mtMet+F+I+G4;cox1	CPREV+I+G;cox1
mtVer+I+G4;nad2	MTMAM+I+G;nad2
mtVer+F+R4;cox2	DAYHOFF+I+G;cox2
mtVer+F+I+G4;nad3	WAG+I+G;nad3, nad5
mtVer+F+I+G4;cox3	MTMAM+I+G;cox3
mtVer+F+I+G4;nad4	WAG+I+G;atp6, nad4
mtVer+F+I+G4;nad5	MTMAM+I+G;nad6, cytb
mtVer+I+G4;nad6	CPREV+G;nad4L
mtVer+F+I+G4;atp6	
mtVer+R7;cytb	
mtVer+F+I+G4;nad4L	
Moder Finder for NUC dataset	Partition Finder for NUC dataset
SYM+I+G4;nad1_codon1	SYM+I+G;nad1_codon1, _cytb_codon1
GTR+F+I+G4;nad1_codon2	GTR+I+G;nad1_codon2, _cytb_codon2
TPM3u+F+ASC+R4;nad1_codon3	GTR+G;nad1_codon3, _nad6_codon3, _cytb_codon3
TN+F+I+G4;cox1_codon1	HKY+I+G;cox1_codon1, _cox2_codon1, _cox3_codon1
GTR+F+I+G4;cox1_codon2	GTR+I+G;cox1_codon2, _cox3_codon2, _cox2_codon2
TPM2u+F+R7;cox1_codon3	GTR+I+G;cox1_codon3, _cox3_codon3
TN+F+I+G4;nad2_codon1	GTR+I+G;nad2_codon1, _nad6_codon1
GTR+F+I+G4;nad2_codon2	GTR+I+G;nad2_codon2, _nad6_codon2
TN+F+R6;nad2_codon3	HKY+G;nad2_codon3
HKY+F+G4;cox2_codon1	GTR+I+G;nad3_codon3, _cox2_codon3, _atp6_codon3, _nad4L_codon3
TVM+F+G4;cox2_codon2	GTR+I+G;nad4L_codon1, _nad4_codon1, _nad5_codon1, _atp6_codon1, _nad3_codon1
TPM3u+F+R6;cox2_codon3	GTR+I+G;nad5_codon2, _nad3_codon2, _nad4L_codon2, _atp6_codon2, _nad4_codon2
TIM2+F+I+G4;nad3_codon1	GTR+I+G;nad5_codon3, _nad4_codon3
TPM2+F+I+G4;nad3_codon2	
GTR+F+I+G4;nad3_codon3	
K3Pu+F+I+G4;cox3_codon1	
GTR+F+I+G4;cox3_codon2	
HKY+F+R4;cox3_codon3	
TPM2u+F+I+G4;nad4_codon1	
GTR+F+I+G4;nad4_codon2	
TIM3+F+R3;nad4_codon3	
TIM2+F+I+G4;nad5_codon1	
GTR+F+I+G4;nad5_codon2	
TIM3+F+R4;nad5_codon3	

 Moder Finder for three locus dataset Partition Finder for three locus dataset

HKY+F+I+G4;nad6_codon1
 TIM3+F+R3;nad6_codon2
 TIM2+F+ASC+G4;nad6_codon3
 TN+F+I+G4;atp6_codon1
 TVM+F+I+G4;atp6_codon2
 TIM3+F+I+G4;atp6_codon3
 TIM2e+I+G4;cytb_codon1
 TPM3u+F+G4;cytb_codon2
 TIM3+F+ASC+R4;cytb_codon3
 TPM2u+F+R3;nad4L_codon1
 K3Pu+F+G4;nad4L_codon2
 TIM3+F+R3;nad4L_codon3

附表 IV 利用 Partitionfinder 筛选的最适分区和模型

Attached Tab. IV Best partitioning scheme and model using partition finder

分区数	最适模型	位点数	分区子集
1	TRN+I+G+X	232	cox1_codon1
2	HKY+I+X	232	cox1_codon2
3	GTR+G+X	232	cox1_codon3
4	GTR+I+G+X	432	16S
5	GTR+G+X	404	28S

附表 V 蚌科物种贝壳形态特征 *

Attached Tab. V Shell morphological characters in Unionidae

分类单元	贝壳形状	贝壳厚度	外套线	铰合部结构
GONIDEINAE				
<i>Lamprotula leaii</i>	卵圆形,椭圆形	厚重	有	Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Ptychorhynchus pfisteri</i>	长椭圆形	中等	有	Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Sinosolenia carinatus</i>	梭形	厚重	有	Pse: absent; Lat: traces
<i>Sinosolenia oleivora</i>	梭形	厚重	有	Pse: absent; Lat: traces
<i>Sinohyriopsis cumingii</i>	不规则三角形,带翼	中等	有	Pse: 2L, 2R; Lat: 2L, 1R
<i>Chamberlainia hainesiana</i>	卵圆形,带翼			Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Potomida littoralis</i>	卵圆形			Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Gonidea angulata</i>	不规则四边形			Pse: 1L, 1R; Lat: absent
<i>Pseudodon mouhotii</i>	elongate			Pse: 1L, 1R (small); "v" shape fossette
UNIONINAE				
<i>Sinanodonta woodiana</i>	卵圆形	脆且薄	没有	teeth absent
<i>Anemina arcaeformis</i>	椭圆形	脆且薄	没有	teeth absent
<i>Cristaria plicata</i>	不规则三角形	中等	有	Pse: absent; Lat: 1L, 1R
<i>Lanceolaria lanceolata</i>	长矛形	厚	有	Pse: 2L, 2R; Lat: 2L, 1R
<i>Acuticosta chinensis</i>	卵圆形	中等	有	Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Lanceolaria grayii</i>	长矛形	厚	有	Pse: 2L, 2R; Lat: 2L, 1R
<i>Schistodesmus lampreyanus</i>	卵圆形或近三角形	厚	有	Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Cuneopsis pisciculus</i>	楔形	厚	有	Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Cuneopsis celiformis</i>	楔形	厚	有	Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Nodularia douglasiae</i>	长椭圆形	厚	有	Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Aculamprotula fibrosa</i>	椭圆形	厚重	有	Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Lepidodesma languilati</i>	椭圆形	薄脆-中等	没有	Pse: absent; Lat: 2L, 1R
<i>Anodonta anatina</i>	椭圆形			teeth absent
<i>Anodonta nuttalliana</i>	椭圆形			teeth absent
<i>Unio crassus</i>	长椭圆形			Pse: 2L, 2R; Lat: 2L, 1R
<i>Unio gibbus</i>	椭圆形			Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
AMBLEMINAE				
<i>Amblema plicata</i>	椭圆形			Pse: 2L, 1R; Lat: 2L, 1R
<i>Actinonaias ligamentina</i>	椭圆形且膨胀			Pse: 2L, 1R (large); Lat: 2L, 1R
<i>Quadrula quadrula</i>	方形			Pse: 2L (heavy), 1R; Lat: 2L, 1R (long)

* 主齿;Pse;侧齿;Lat,左壳;L;右壳;R,黑体字体表示中国蚌类物种,数据来源本研究;非黑体字体表示非中国蚌类,数据则来源 Lopes-Lima 等^[1].

参考文献

- [1] Lopes-Lima M, Froufe E, Ghamizi M *et al.* Phylogeny of the most species-rich freshwater bivalve family (Bivalvia: Unionida: Unionidae): Defining modern subfamilies and tribes. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2017, **106**: 174-191.

附表VI 蚌科物种解剖形态特征*

Attached Tab. VI Anatomical morphological features in Unionidae

分类单元	钩介幼虫形状	钩介幼虫指数	繁殖时期	育儿囊类型	有无胶质索	入水孔形态	出水孔形态	鳃形态*	数据来源文献
GONIDEINAE									
<i>Lamprotula leaii</i>	半椭圆形, 无钩	中型	2-5月	外鳃类四生型	无	乳突; 2~3行	光滑	1	[1]
<i>Sinosolenia carinata</i>	半椭圆形, 有钩	小型	12月	外鳃类四生型	无	乳突; 角质状	乳突; 角质状	1	[1-2]
<i>Sinosolenia olivora</i>	半椭圆形, 无钩	中型	2-5月	外鳃类四生型	无	乳突; 树枝状	光滑	1	[1,4]
<i>Sinohyriopsis cumingii</i>	半椭圆形, 无钩	中型	4-10月	外鳃类同生型	无	乳突; 2~3行	光滑	—	[1]
<i>Microcondylaea bonellii</i>	半椭圆形, 无钩	中型	短期繁殖	外鳃类同生型	—	—	—	—	[3]
<i>Gonidea angulata</i>	半椭圆形, 无钩	中型	短期繁殖	外鳃类四生型	—	—	—	—	[3]
<i>Hyriopsis bidata</i>	半椭圆, 无钩	中型	短期繁殖	外鳃类同生型	—	—	—	—	[3]
<i>Hyriopsis desonitzi</i>	半椭圆, 无钩	中型	短期繁殖	外鳃类四生型	—	—	—	—	[3]
<i>Potomida littoralis</i>	半椭圆形, 无钩	中型	短期繁殖	外鳃类四生型	—	—	—	—	[3]
UNIONINAE									
<i>Sinanodonta woodiana</i>	三角形, 有钩	大型	3-6月	外鳃类同生型	无	乳突; 2~3行	光滑	2	[1]
<i>Anemina arcaeiformis</i>	三角形, 有钩	大型	12-3月	外鳃类同生型	无	乳突; 2~3行	光滑	2	[1]
<i>Cristaria plicata</i>	三角形, 有钩	中型	9-4月	外鳃类同生型	无	乳突; 2~3行	乳突; 1行	—	[1]
<i>Acuticosta chinensis</i>	葫芦形, 有钩	中型	2-10月	外鳃类同生型	有	乳突; 2~3行	光滑	3	[1,5]
<i>Lanceolaria lanceolata</i>	三角形, 有钩	—	4-9月	外鳃类同生型	无	乳突; 2~3行	—	—	[1,5]
<i>Lanceolaria grayana</i>	三角形, 有钩	中型	3-8月	外鳃类同生型	有	乳突; 2行	—	4	[1,5]
<i>Schistodesmus lampreyanus</i>	三角形, 有钩	—	2-5月	外鳃类同生型	有	乳突; 2~3行	光滑	3	[1,5]
<i>Cuneopsis pisciculus</i>	三角形, 有钩	中型	4-6月	外鳃类同生型	无	乳突; 2行	光滑	4	[1,5]
<i>Nodularia douglasiae</i>	三角形, 有钩	中型	2-7月	外鳃类同生型	有	乳突; 2~3行	乳突; 1行	3	[1,5]
<i>Aculanprotula fibrosa</i>	三角形, 有钩	中型	11-1月	外鳃类同生型	无	乳突; 2~3行	光滑	4	[1,5]
<i>Lepidodesma languilati</i>	三角形, 有钩	大型	2-8月	外鳃类同生型	无	—	—	2	[1,5]
<i>Lasimigona compressa</i>	不对称, 有钩	大型	长期繁殖	外鳃类同生型	—	—	—	—	[3]
<i>Anodonta anatina</i>	三角形, 有钩	大型	长期繁殖	外鳃类同生型	—	—	—	—	[3]
<i>Pseudanodonta complanata</i>	三角形, 有钩	大型	长期繁殖	外鳃类同生型	—	—	—	—	[3]

续附表VI

分类单元	钩介幼虫形状	钩介幼虫指数	繁殖时期	育儿囊类型	有无胶质索	入水孔形态	出水孔形态	鳃形态*	数据来源文献
<i>Unio crassus</i>	三角形,有钩	中型	短期繁殖	外鳃类同生型	—	—	—	—	[3]
<i>Unio pictorum</i>	三角形,有钩	中型	短期繁殖	外鳃类同生型	—	—	—	—	[3]
AMBLEMINAE					—	—	—	—	
<i>Amblema plicata</i>	半椭圆,无钩	中型	短期繁殖	外鳃类四生型	—	—	—	—	[3]
<i>Actinonaias ligamentina</i>	半椭圆,无钩	中型	长期繁殖	外鳃类同生型	—	—	—	—	[3]
<i>Lampsilis cardium</i>	半椭圆,无钩	中型	长期繁殖	外鳃类同生型	—	—	—	—	[3]

* 黑体字体表示物种为中国蚌类,非黑体表示物种非中国蚌类,* 1 没有鳃水管和真正隔膜;2 有三部分组成的真正鳃水管;3 有真正的鳃水管,瓣间隔膜不完整,水管间有小孔相通;4 有鳃水管,瓣间隔膜完整,鳃水管间无小孔相通。

参考文献

- [1] Wu XP. Freshwater shellfish in the middle and lower reaches of the Yangtze River[Dissertation]. Wuhan: Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, 1998.[吴小平. 长江中下游淡水贝类的研究[学位论文]. 武汉:中国科学院水生生物研究所, 1998.]
- [2] Cao Y, Liu X, Wu R *et al.* Conservation of the endangered freshwater mussel *Solenia carinata* (Bivalvia, Unionidae) in China. *Nature Conservation*, 2018, **26**: 33-53.
- [3] Lopes-Lima M, Froufe E, Ghamizi M *et al.* Phylogeny of the most species-rich freshwater bivalve family (Bivalvia: Unionida: Unionidae): Defining modern subfamilies and tribes. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2017, **106**: 174-191.
- [4] Wang Y, Zhang G, Wei K *et al.* Reproductive traits of the threatened freshwater mussel *Solenia oleinora* (Bivalvia: Unionidae) from the middle Yangtze River. *Journal of Molluscan Studies*, 2015, **81**(4): 522-526.
- [5] Wu R, Chen T, Zanatta DF *et al.* Reproductive traits of nine freshwater mussel species (Mollusca: Unionidae) from Poyang Lake, China. *Journal of Molluscan Studies*, 2018, **84**(3): 324-332.

附图 I 基于多位点分子标记构建的蚌目 ML 树(进化枝红色圆点表示节点自展支持率(>70%), 图中不同颜色的分枝代表蚌目不同科阶元以及蚌科亚科阶元)

Attached Fig. I Phylogenetic trees of freshwater mussels inferred from Bayesian Inference (BI) analyses (Red circles on the branches represent bootstrap support (>70%)

Colored branches represent order levels of different families and subfamily levels of the Unionidae)